

AVERTISSEMENTS AGRICOLES



STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE
ET DE LA FORÊT
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Ancienne Conserverie de CASAMOZZA
LUCCIANA - 20290 - BORGO

Tél. 95.36.05.70



EDITION CORSE

Bulletin Technique N° 3
du 19 Février 1993

VIGNE

DESHERBAGE

Rappelons que l'usage des spécialités apportant plus de 1500 g/ha de Simazine est interdit depuis 1992.

Admettre aussi que la maîtrise des mauvaises herbes est réalisée par des applications fractionnées d'herbicide pour la simple raison que les herbes ne "sortent" pas toutes à la même époque, notamment pour les levées tardives d'une part, et pour minimiser les risques de phytotoxicité du Diuron d'autre part.

L'apport fractionné implique de réaliser la première application en prédébouillage, la seconde mi-mai, mi-juin suivant les cas de réenherbement

Diverses associations sont autorisées

Spécialités	Doses par ha			
Baral	une fois à	6 l,	la seconde à	4 litres
Claisol 85	une fois à	9 l,	la seconde à	12 litres
Cléry	" "	3 l,	" "	" 3 "
Compliss	" "	4 l,	" "	" 4 "
Elson	" "	3,5 l,	" "	" 5 "
Fenican	" "	4 l,	" "	" 4 "
Peral vigne	" "	3 l,	" "	" 3 "
Trévi 10	" "	5 l,	" "	" 7 "
Végé Pron D.S.	" "	6 l,	" "	" 8 "

En sols filtrants les doses sont diminuées.

P.177

ASSOCIATIONS DIURON + NORFLURAZON

Le Norflurazon a une bonne efficacité sur graminées et sur certaines Dicotylédones. Il est efficace sur les adventices résistantes aux Triazines.

SOLICAM S et ZORIAL

Appliquer dès à présent au plus tard à la fin mars en prédébourrement puis mai.

- Zorial 2,5 + Cent 7 de 6 et 7 l/ha
- Zorial 1,5 + Diuron
- Solicam S 5 kg/ha en 1 fois
- Solicam S 3 kg/ha puis Solicam S à 3 kg en mai

ISOXABEN : (Cent 7) (Quatuor)

Du fait de sa persistance d'action permet de "tenir propre" en une seule application à condition de l'utiliser sur sol non enherbé.

HERBICIDES DE PRE-LEVÉE CONSEILLES SUR VIGNES JEUNES DE MOINS DE 4 ANS

Première année de plantation

Spécialités	Doses par ha	Observations
Amex	10 litres	irrégulier
Cent7	8 "	bon sur dicotes
Devrinal	9 "	insuffisant
Surflan	8 "	insuffisant

En deuxième année de plantation

On peut utiliser en pré-débourrement les spécialités suivantes :

CARAZOL à 1,5 l/ha
PRIUS à 10 l/ha

NB

Le deshérbage chimique demande de la précision, et de la rigueur.
Il doit tenir compte :

- De l'âge du vignoble
 - plus de quatre ans
 - moins de quatre ans
- Du type de sol
 - (lourd ou filtrant) sableux, argileux, du taux de matière organique.
- De la flore dominante (graminées, dicotyledones, des vivaces)
- De la connaissance de l'action des herbicides utilisés.
- De l'humidité du sol, notamment dans le cas des produits d prelevés.

ex = pour le CENT 7 , une pluie facilite la pénétration de l'herbicide.

- De la propreté du sol.
- De réglage des appareils

Attention : l'emploi de l'aminotriazole est interdite de la Nouaison aux Vendanges en post levée des vivaces.

S.R.P.V. - 1993 - Toute reproduction même partielle est soumise à notre autorisation